

STREFY SANITARNE

Powierzchnia przewidziana do sprzątania, utrzymania czystości, higieny szpitalnej, dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych podzielona jest na następujące strefy:

STREFA I	STREFA II		STREFA III		STREFA IV
Czystości ciągłej	Czystości ogólnej		Czystości zmiennej		Ciągłego skażenia
Wolny od flory patogennej	Niskiego ryzyka		Wysokiego ryzyka		Bardzo wysokiego ryzyka
<ul style="list-style-type: none">- magazyny zasobów czystych (oddział, magazyn bielizny czystej)- magazyny materiałów sterylnych (Centralna Sterylizatornia, Blok Operacyjny)	<ul style="list-style-type: none">- korytarze wewnętrzne- windy- klatki schodowe- biura- sala konferencyjna- pomieszczenia techniczne- dyżurki lekarskie i pielęgniarskie (pomieszczenia socjalne)- poczekalnie,- pokoje badań	<ul style="list-style-type: none">- Pomieszczenie rejestracji- gabinety diagnostyki nieinwazyjne (RTG, USG, EKG, spirometrii, audiometrii),- obszar wstępnej segregacji i przyjęć chorych w SOR- poradnie specjalistyczne niezabiegowe- gabinety rehabilitacyjne- kuchenki oddziałowe- pomieszczenie dystrybucji posiłków i napojów- kaplica	<ul style="list-style-type: none">- blok operacyjny- trakt porodowy- pomieszczenia patologii noworodka- gabinety zabiegowe- gabinety diagnostyki inwazyjnej- sale pooperacyjne,- sale opatrunkowe,- sale ogólne chorych,- sale IT, OIOM, SOR- sale chorych o obniżonej odporności- izolatki- poradnie specjalistyczne zabiegowe- pracownia endoskopii i bronchoskopii,- Centralna Sterylizatornia	<ul style="list-style-type: none">- toalety i łazienki- brudowniki- pomieszczenia składowania odpadów, brudnej bielizny- pomieszczenie pro morte i patomorfologii	
	Strefa dotykowa	Strefa bezdotykowa	Strefa dotykowa	Strefa bezdotykowa	
Mycie i dezynfekcja niskiego stopnia	Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia	Mycie	Mycie oraz dezynfekcja średniego stopnia	Mycie i dezynfekcja niskiego stopnia	Mycie i dezynfekcja średniego stopnia
Preparaty o spektrum (B,F) oraz V osłonkowe (HBV, HCV, HIV)	Preparaty o spektrum (B,F) oraz V- osłonkowe (HBV, HCV, HIV)	Profesjonalny detergent	Preparaty o spektrum (B,F, V, Tbc) wirusy osłonkowe i nieosłonkowe	Preparaty o spektrum (B,F) oraz V- osłonkowe (HBV, HCV, HIV)	Preparaty o spektrum (B,F, V, Tbc) wirusy (osłonkowe i nieosłonkowe)
Z uwagi na organizację pracy, zalecany jest proces jednoetapowy, wykonywany przy użyciu preparatu myjąco – dezynfekującego nie wymagającego spłukania.					
W przypadku zakażenia lub kolonizacji pacjenta z patogenem alarmowym należy stosować preparat dezynfekcyjny odpowiedni do zagrożenia. W przypadku pacjenta zakażonego drobnoustrojem wytwarzającym przetrwalniki należy stosować preparat o spektrum działania ,F,V,Tbc,S					
W przypadku skażenia ludzkim materiałem biologicznym (np. krew, płyn mózgowo – rdzeniowy, mocz, kał, płwocina, treść żołądkowa) dezynfekcja średniego stopnia (B, F,V,Tbc) wykonywana po uprzednim usunięciu materiału biologicznego.					

Strefa bezdotykowa obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego, (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów, osób odwiedzających oraz sprzętu medycznego), kontaktu z pacjentem.

Ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie. W środowisku szpitalnym do strefy bezdotykowej zaliczono m.in. podłogi, ściany, okna.

Strefa dotykowa obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent, personel i osoby odwiedzające kontaktują się często, ale nie zostały one skażone wydaliniami i wydzielinami pochodzenia ludzkiego (np. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treść żołądkowa, kał, plwocina). Z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego, ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże. Podobnie jak ryzyko przeniesienia znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę.

W środowisku szpitalnym do strefy dotykowej zaliczono m.in. klamki i uchwyty, kontakty i słuchawki telefoniczne, ramy łóżek i poręcze krzeseł, blaty robocze, strefę wokół umywalki.